

ALIDYA

Anti LipoDystrophic Agents



ALIDYA

Anti LipoDystrophic Agents

Антицеллюлитная процедура **ALIDYA™** — единственное средство от целлюлита. Инновационное решение дает видимые результаты после 4 процедур при использовании отдельно, а также максимально увеличивает потенциал аппаратов для уменьшения целлюлита.


- ✓ НЕХИРУРГИЧЕСКИЙ И МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД
- ✓ УМЕНЬШАЕТ И УЛУЧШАЕТ ЦЕЛЛЮЛИТ
- ✓ УЛУЧШАЕТ ЛИМФОДРЕНАЖ

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ

ALIDYA™ – первый и единственный созданный препарат для лечения гиноидной липодистрофии (целлюлита).

С тех пор он был признан медицинскими работниками во всем мире как одно из последних достижений в области лечения подтяжки кожи, существующий на рынке уже 10 лет.

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents




ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Целлюлит - это хронический дегенеративный процесс, происходящий в подкожно-жировой клетчатке, который проявляется эстетическим дефектом "апельсиновой корки".

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents



НОВЫЙ ПОДХОД КОРРЕКЦИИ ЦЕЛЛЮЛИТА

- Первичные факторы (предрасположенность): ДНК и фенотип
- Вторичные (определяющие): эндокринная, вегетативная нервная и вено-лимфатическая системы.
- Третичные (провоцирующие): питание, малоподвижный образ жизни, курение, алкоголь, осанка, оксидативный стресс, воспаление, воздействие тяжелых металлов.

ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА: СТАДИИ ЦЕЛЛЮЛИТА

Женщины, которые имеют проявления целлюлита 1-2 стадии в области ягодиц, задней поверхности бедра, живота.

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents


СТАДИЯ 0



Не обнаруживается в положении стоя или лежа, отрицательный результат теста на зажим, нет "матрасного" внешнего вида, "апельсиновая корка" отсутствует

СТАДИЯ 1

✓ **ALIDYA™**



"Апельсиновая корка" отсутствует, если пациент стоит или лежит, появляется лишь тогда, когда после зажимания двумя пальцами части кожи, заметен бледный или "мраморный" цвет кожи, пониженная температура кожи и ее эластичность


СТАДИЯ 2

✓ **ALIDYA™**



"Апельсиновая корка" не видна, когда тело находится в покое, появляется спонтанно, когда пациент стоит, но не тогда, когда лежит, бледность немного заметнее, чем при первой стадии, наблюдается отечность и узлы жировых клеток

СТАДИЯ 3



"Апельсиновая корка" проявляется при любом положении тела, эластичность ткани серьезно нарушена, видны группы поврежденных клеток, при надавливании на них может проявляться болезненность, ярко выраженная отечность

ALIDYA™ – это первое и единственное средство, специально предназначенное для профилактики и патогенетического лечения гиноидной липодистрофии (целлюлита).

Этот препарат разработан на основе исследований механизма появления целлюлита, проведенных известным эстетическим хирургом и вице-президентом Итальянского общества эстетической хирургии и медицины профессором Паскуале Мотолезе, который определил, что отложение вредных внеклеточных токсичных ионов металлов, приводит к ухудшению микроциркуляции - и это является главным фактором, способствующим возникновению целлюлита.

Основной принцип действия Alidya проявляется в хелатировании (обезвреживании) ионов металлов и очистке межклеточного пространства, что клинически проявляется улучшением состояния тканей.



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА


Alidya воздействует на самую причину
появления целлюлита,
а не временно устраняет симптомы

- Нормализует pH
- Повышает осмолярность
- Высвобождает CO₂
- Образует хелаты
- Антиоксидант, оказывает
противоокислительное действие
- Способствует восстановлению белков

Motolese P. Extracellular iron toxicity as a determinant physiopathological model for so-called "cellulite". *Eur. J. Aesth. Medicine and Dermatology*. 2011;1(1):17-21

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents

**благодаря чему удастся получить
ГАРАНТИРОВАННЫЙ
И УСТОЙЧИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.**




КАК РАБОТАЕТ АЛИДИЯ?

ALIDYA™ — результат исследования **профессора Паскуале Мотолезе**, который определил ключевую роль ионов тяжелых металлов как одной из причин целлюлита. Эти тяжелые металлы высвобождаются в результате изменения микроциркуляции, возникающего при целлюлите, и ответственны, среди прочего, за усиление повреждающего действия свободных радикалов в коже и подкожной клетчатке.

ALIDYA™ включает в свою формулу вещества, способные хелатировать эти токсичные элементы и предотвращать дальнейшее повреждение дермы.

ALIDYA™ включает в себя антиоксиданты, аминокислоты и буферные системы, которые способствуют восстановлению нормальной физиологии кожи и, следовательно, улучшению ее внешнего вида.

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents



СОСТАВ ALIDYA™

- Гель полиаминокислотный из гидролизованного бычьего коллагена (Hydrolysed Bovine a. Gelatine) включающий: L-isoleucine, SH Methionine, L-Lysine, L-proline, L-glycine, L-serine, L-leucine, L-alanine, L-valine
- α -D-glucopiranoside- α 1-4 glucosidic (D-(+) Альфа-D-глюкопираноза 1-4 глюкозид)
- NaEDTA (etilen-diamino-tetraacetic), натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
- Аминокислотная буферная система с бикарбонатно-натриевым корректором pH
- Регулятор осмолярности

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents



Инновационное лечение **ALIDYA™** предназначено для специфической растворимости и удаления токсичных внеклеточных элементов, вторичных по отношению к сосудистому повреждению микроциркуляции, и обеспечения биологических компонентов для реструктуризации внеклеточного матрикса.

Также восстанавливает нормальный гомеостаз клетки, что клинически дает видимый эффект улучшения целлюлита в пораженной области и предотвращает его дальнейшее прогрессирование.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ALIDYA™

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents

НАПРАВЛЕННЫЙ НА:

→ нейтрализацию и удаление токсичных внеклеточных элементов (ионов металлов), что нарушают микроциркуляцию и способствуют появлению целлюлита;

→ подщелачивание внеклеточного матрикса;

→ насыщение тканей кислородом

→ предоставление биологических компонентов для изменения структуры внеклеточного матрикса;

→ нормализацию физиологической функции жировой ткани.

Как **ALIDYA™** растворяет и удаляет внеклеточные токсичные элементы, одновременно восстанавливая нормальный гомеостаз клеток.

Это действие обусловлено способностью подкожной жировой ткани к объемной реструктуризации с помощью смеси аминокислот с разветвленной и неразветвленной цепью, связанных с подщелачивающей системой внеклеточного матрикса, и специально изученной осмолярностью, способной сбалансировать морфоструктурные особенности жировая ткань.

ALIDYA™

Решение для коррекции профилометрических изменений поверхности вследствие гинойдной липодистрофии


ALIDYA™ после разведения представляет собой густой раствор, способный вызвать прогрессивную, постепенную объемную реструктуризацию явных изменений кожи в результате синдромов гинойдной липодистрофии.



КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ МЫ ПОЛУЧИМ ПОСЛЕ КУРСА ПРОЦЕДУР ALIDYA™ :


ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents

Piel con celulitis



© James Steidl - Fotolia.com

Piel sin celulitis



- ✓ улучшение контуров тела;
- ✓ гарантированное устранение эффекта апельсиновой корки
- ✓ выравнивание рельефа и повышение тонуса кожи

ОБЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Живот



Бедра



Ягодицы



Бока



Колена




Если вы стремитесь уменьшить проявления целлюлита на животе, бедрах, боках или ягодицах и коленях, **ALIDYA™** представляет универсальное решение для целенаправленного уменьшения целлюлита на всех участках тела.

УПАКОВКА

ALIDYA™ поставляется
в упаковке, содержащей

5 флаконов с 340 мг порошка
в каждом, содержимое флакона
стерильное, апирогенное и

5 ампул объемом по 10 мл
со стерильным раствором.




ЭФФЕКТИВНЫЕ, ЦЕЛЕВЫЕ И СТАБИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents

ALIDYA™ — одна из самых эффективных процедур, предлагаемых в вашей клинике, особенно в сочетании с антицеллюлитными аппаратами и методами.

Результаты **ALIDYA™** в сочетании с альтернативными антицеллюлитными методами лечения или без них не имеют себе равных по сравнению с любой другой методикой



ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ALIDYA™

1. Провести маркировку зоны, которая подлежит лечению

2. Подготовить раствор.

Для этого, **10 мл** растворителя в ампуле надо набрать в стерильный шприц, затем ввести его во флакон с порошком, который нужно растворить, следя за тем, чтобы все шаги выполнялись в стерильных условиях.

Встряхнуть смесь в течение нескольких секунд, затем подождать, пока раствор не станет прозрачным.

Сразу после приготовления раствор может иметь светло-розовый цвет и характерный запах.

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents



ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

3а. Вариант топический (используется при регистрации как косметическая мезо сыворотка)

Препарат наносится на подготовленную с помощью технологии «микронидлинга» (MTS) кожу, для облегчения проникновения активных веществ в дерму. Микропроколы на глубину 1-4 мм, используя, мезоштамп, мезороллер или дермапен, или посредством трансдермальной доставки препарата фонофорезом.

3б. Вариант инъекционный (по рекомендации производителя, используется при регистрации как ИМН)

Выполнить мезотерапевтические инъекции подкожно, болюсно, по 0,2 мл на введение с расстоянием 2-3 см между уколами.

Для введения препарата применять:

- игла **13 мм x 30 G**
- $\angle$ **30-90°**
- глубина - **4-6 мм**
- шприц **10 мл** с Luer Lock (для обеспечения фиксации иглы)

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents



ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

4. Перед введением готового раствора необходимо провести тщательную очистку и полную дезинфекцию участка кожи.
5. Выполнить нанесение/введение препарата в зависимости от выбранного протокола
6. Для проведения **1 сеанса** понадобится **1-2 дозы** готового раствора. Количество доз на 1 сеанс зависит от конституционных особенностей пациента и площади лечения. **1 флакон** готового раствора рассчитан на площадь **15 см²**.


ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents



ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Препарат **ALIDYA™** можно применять топически в участки, пораженные гиноидной липодистрофией (целлюлитом), методом фракционной мезотерапии или с предварительным микро туннелированием дермы для облегчения попадания раствора в кожу


Для достижения полного результата процедуры **ALIDYA™** требуют в среднем **от 7 до 10 сеансов** для конкретного участка.



КУРС ЛЕЧЕНИЯ ALIDYA™

Составляет 7-10 сеансов с интервалом 7 дней. Курс лечения рекомендовано повторить через 6 месяцев.

Инновационное решение **ALIDYA™** дает видимые результаты после 4 процедур при использовании отдельно, а также максимально увеличивает потенциал аппаратов и препаратов для уменьшения целлюлита.



СОЧЕТАНИЯ С ИНТРАЛИПОТЕРАПИЕЙ AQUALYX



Для получения наилучших результатов производитель рекомендует комбинировать лечение препаратом **ALIDYA™** уникальным адипоцитолитиком **AQUALYX™**

ВАЖНО!

ПРАВИЛА КОМБИНИРОВАНИЯ **ALIDYA™** С ПРЕПАРАТОМ **AQUALYX™**

Не применять эти **2 препарата одновременно**, в один сеанс и не чередовать данные процедуры.

Рекомендуется пройти полный курс процедур препаратом **ALIDYA™**, а после его окончания – начать курс **AQUALYX™** или наоборот - в зависимости от того, какая проблема больше беспокоит пациента.

Интервал между процедурой интралипотерапии **AQUALYX™** и **ALIDYA™** необходим перерыв в 12-14 дней

ALIDYA™ & AQUALYX™


ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents

1 флакон /10см2


1-2 флакон/ неделя

AQUALYX™

ALIDYA™



ALIDYA™ 1-2 флакон/ 15 дней



Лечение, направленное на коррекцию
сосудистого компонента

Benzopirona (5 mg/ml) 2 мл
Teofilina (20 mg/ml) 1 мл
Conjonctyl® (5 mg) 1 мл
Procaína (2%) 1 мл

СОЧЕТАНИЯ С АППАРАТНЫМИ МЕТОДАМИ

Для получения наилучших результатов можно комбинировать лечение препаратом **ALIDYA™** со следующими аппаратными методиками, такими как LPG, Hi-FU, RF, карбокситерапия.

ВАЖНО!

Интервал между процедурой **ALIDYA™** и аппаратной терапией 2-3 дня.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат не должен применяться:

- Пациентам с острыми или хроническими патологиями кожи в зонах, подлежащих коррективке или непосредственно вблизи них,
- Лицам с положительной анафилактической реакцией
- Лицам с тяжелыми заболеваниями органов и систем, включая аутоиммунные заболевания
- Детям
- Беременным и кормящим женщинам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ALIDYA™

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents

ALIDYA™ дала замечательные результаты бесчисленному количеству пациентов, преобразовав их тела и повысив их уверенность в себе.



РЕЗУЛЬТАТЫ ALIDYA™

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents

Люди испытали видимое уменьшение целлюлита благодаря формуле ALIDYA™, которая обеспечивает биологические компоненты (аминокислоты), необходимые для производства новых и сильных коллагеновых волокон, а также балансирует pH дермы и подкожных тканей.



РЕЗУЛЬТАТЫ ALIDYA™

До



После 3х процедур



РЕЗУЛЬТАТЫ ALIDYA™

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents

До



После 3х процедур



РЕЗУЛЬТАТЫ ALIDYA™

ALIDYA
Anti LipoDystrophic Agents

До



После 3х процедур





Спасибо за внимание!



ООО "НИКЕ-МЕД"

121087 г. Москва, ул. Барклая, д.6 стр.5

тел.: +7 495 287 46 45

+7 (926) 873-08-62

nike-med.com

