

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Отличный результат уже через несколько дней
- Эффективная коррекция гипермеланозов (хлоазма, эфелиды)
- Эффективен при гиперкератозе, в том числе при фолликулярном гиперкератозе (себорея, угревая болезнь)
- Подходит для кожи любого фототипа
- Хорошая переносимость, высокая безопасность
- Запускает механизм истинного омоложения

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ CIMEL

1. Мелазма и себорея



2. Мелазма+лентиго
+актинический кератоз



3. Рубцы после ожога



cimel

innovation concept peel

продли молодость своей кожи

Martinex

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ

www.martinex.ru



НОЯБРЬ 2014

НОВАЯ ФОРМА ICP

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

- Инволютивные изменения кожи (фотостарение, хроностарение)
- Гиперкератоз
- Гиперпигментация (мелазма, хлоазма, эфелиды)
- Себорея, угревая сыпь 1 ст. (фолликулярный гиперкератоз)
- Хроностарение
- Гормональное старение
- Гемосидериновая пигментация (ксантелазмы, рубцы, пигментация после склеротерапии)
- Угревая болезнь
- Эфелиды (веснушки)

ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ

Главный активный компонент пилинга – ретинол, который, не повреждая кожу, нормализует процессы кератинизации, восстанавливает внеклеточные структуры дермы, оказывает выраженное отбеливающее действие.

ФОТОСТАРЕНИЕ, ХРОНОСТАРЕНИЕ

Ретинол активизирует деление базальных кератиноцитов, ускоряя обновление клеток эпидермиса. Стимулирующее действие на клеточные структуры кожи сохраняется в течении 4х месяцев. Оказывает ремоделирующее действие на внеклеточные структуры дермы. Не вызывая коагуляцию белка, не повреждая кожу, пилинг оказывает омолаживающее действие, сравнимое с действием срединных пилингов.

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

Ретинол уменьшает клеточную атипию. Предупреждает развитие базальноклеточного рака кожи.

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

Ретинол, входящий в состав CIMEL, угнетает тирозиназу, подавляет пиноцитоз меланосом кератиноцитами, механически удаляет клетки, содержащие меланин. Воздействуя на три патогенетических звена, препарат CIMEL обладает отличными терапевтическими свойствами в отношении коррекции пигментных пятен.*

СЕБОРЕЯ

Воздействует на фолликулярный гиперкератоз, уменьшает когезию корнеоцитов. Способствует свободному выделению себума, препятствует образованию комедонов.

* Некоторые пигментные пятна: меланоцитарный невус, сенильное лентиго, родинки и пятна, вызванные внешними факторами (например, татуировки) – не поддаются лечению с помощью процедуры CIMEL и могут быть удалены только с помощью лазерной терапии.

ПРЕПАРАТЫ CIMEL



CIMEL MANTENIMIENTO
крем для основного ухода:

- РЕТИНОЛ
- КОЙЕВАЯ КИСЛОТА
- ЭКСТРАКТ ЭМБЛИКИ
- ЭКСТРАКТ ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ
- ФИТОНАДИОН

CIMEL ACTIVADOR
крем-активатор:

- РЕТИНОЛ
- КОЙЕВАЯ КИСЛОТА
- ЭКСТРАКТ ЭМБЛИКИ
- САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
- ФИТОНАДИОН

ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ

Процедура пилинга

- 1 Очистить кожу с помощью CLEANSER MOUSSE (линия MedicControlPeel)
- 2 Нанести alpha&beta комплекс лосьон LACAO RICO (линия MedicControlPeel) на 10 минут. Смыть водой. Кожу просушить.
- 3 Нанести крем-активатор. Оставить на 1– 12 часов, в зависимости от выраженности гиперкератоза
- 4 Снять маску с помощью воды
- 5 Нанести крем VEGEFARMA CREAM или VEGELIP CREAM (линия MedicControlPeel)

Постпилинговый период (первые 10-20 дней)

По мере необходимости наносить крем VEGEFARMA CREAM или VEGELIP CREAM (линия MedicControlPeel), а также солнцезащитный крем MediScreen (из линии MedicControlPeel).

Поздний постпилинговый период (начиная с 30 дня)

Используется крем MANTENIMIENTO один раз на ночь 3 раза в неделю. Утром солнцезащитный крем MediScreen (из линии MedicControlPeel).