

# УРОГИНЕКОЛОГИЯ

Интимный филлинг (аугментация) – это метод инъекционной контурной пластики аногенитальной области, позволяющий восполнять объем мягких тканей путем введения препаратов гиалуроновой кислоты интра- и субдермально, подслизисто.

Наиболее современным методом интимной контурной пластики, проводимой с целью коррекции анатомии и функциональных нарушений аногенитальной области, является введение гелей на основе гиалуроновой кислоты созданных специально для этой области тела. Основные критерии выбора препарата: максимальная эффективность и клинически доказанная безопасность.

## Amalain Intimate

Интимная контурная пластика

AMALAIN INTIMATE – монофазный филлер средней плотности на основе 2 % (20мг/мл) поперечно - сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения.

Предназначен для увеличения и восполнения объема мягких тканей в интимной области.

AMALAIN INTIMATE при введении увеличивает объем выбранного участка, создает дополнительную гидратацию кожи и слизистых оболочек, возвращает эластичность, тонус, способствует процессу

① Лабиопластика – коррекция объема и формы больших и малых половых губ

② Перинео - пластика – коррекция пред - дверия и стенок влагалища

③ Клиторо - пластика – увеличение объема головки и капюшона клитора

④ Аугментация зоны G

⑤ Коррекция инволюционных изменений

⑥ Косметическая коррекция – «эффект омоложения»



естественного обновления.

Встраиваясь в окружающие ткани, инъекционный гель с течением времени подвергается распаду под воздействием ферментов, но оставляет объем ткани прежним даже в процессе расщепления.

Средняя продолжительность биодеградации 9-12 месяцев.

| Зона коррекции | Большие и малые половые губы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Преддверие влагалища                                                                   | Стенки влагалища                                                                                                | Клитор                                                                                                         | Зона G                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показания      | Деформации (посттравматические, послеоперационные, послеродовые рубцы)<br>Асимметрия<br>Дефекты промежности (анатомические, послеоперационные, посттравматические, послеродовые, врожденные)<br>Зияние половой щели вследствие недостаточно выраженных половых губ (гипоплазия, аплазия)<br>Сухость слизистой<br>Снижение тонуса кожи, дряблость и провисание мягких тканей промежности, стенок влагалища вследствие возрастных инволюционных изменений<br>Липодистрофия больших половых губ | Сухость слизистой (ксероз)<br>Крауроз<br>Раздражения<br>Частые воспалительные процессы | Снижение тонуса стенок влагалища вследствие возрастных инволюционных изменений.<br>Сухость слизистой<br>Крауроз | Недостаточная выраженность<br>Сниженная чувствительность.<br>Полностью скрыт под кожным лоскутом («капюшоном») | Аномалия формы влагалища<br>Недостаточное достижение сексуального удовлетворения<br>Психологический дискомфорт и сниженная самооценка<br>Сниженное либидо<br>Коррекция недержания мочи<br>Коррекция гипермобильности уретры |